

Données du registre du cancer de l'Isère

Col de l'utérus - 2012

Mise à jour le 2023-07-12

Femmes

| | Nombre de cas (%) | TI brut |
|------------------------------|-------------------|---------|
| Répartition par classe d'âge | | |
| De 0 à 4 ans | 0 (0%) | 0 |
| De 5 à 9 ans | 0 (0%) | 0 |
| De 10 à 14 ans | 0 (0%) | 0 |
| De 15 à 19 ans | 0 (0%) | 0 |
| De 20 à 24 ans | 0 (0%) | 0 |
| De 25 à 29 ans | 1 (2.6%) | 2.8 |
| De 30 à 34 ans | 2 (5.1%) | 5.1 |
| De 35 à 39 ans | 5 (12.8%) | 12.1 |
| De 40 à 44 ans | 4 (10.3%) | 9 |
| De 45 à 49 ans | 3 (7.7%) | 6.9 |
| De 50 à 54 ans | 7 (17.9%) | 17.4 |
| De 55 à 59 ans | 3 (7.7%) | 7.8 |
| De 60 à 64 ans | 2 (5.1%) | 5.4 |
| De 65 à 69 ans | 1 (2.6%) | 3.4 |
| De 70 à 74 ans | 2 (5.1%) | 8.9 |
| De 75 à 79 ans | 4 (10.3%) | 18.9 |
| De 80 à 84 ans | 2 (5.1%) | 10.6 |
| Les 85 ans et plus | 3 (7.7%) | 15.3 |

Femmes

| | Nombre de cas | TI brut | TI standardisé ¹ |
|----------------------|---------------|---------|-----------------------------|
| Toutes classes d'âge | 39 | 6.2 | 4.2 |

¹Standardisé sur la population féminine mondiale
TI : Taux d'incidence pour 100 000