

Données du registre du cancer de l'Isère

Fosses nasales, sinus annexes de la face, oreilles moyenne et interne - 2017

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	1 (20%)	2.3	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 55 à 59 ans	0 (0%)	0	1 (50%)	2.5
De 60 à 64 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 65 à 69 ans	1 (20%)	3.1	0 (0%)	0
De 70 à 74 ans	1 (20%)	4	0 (0%)	0
De 75 à 79 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 80 à 84 ans	1 (20%)	7.6	0 (0%)	0
Les 85 ans et plus	1 (20%)	8.7	1 (50%)	4.1

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	5	0.8	0.4	2	0.3	0.1

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000