

Données du registre du cancer de l'Isère

Larynx - 2017

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	1 (2.1%)	2.7	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	1 (2.1%)	2.5	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	2 (4.2%)	4.5	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	3 (6.2%)	7.1	1 (20%)	2.3
De 55 à 59 ans	10 (20.8%)	26.3	1 (20%)	2.5
De 60 à 64 ans	6 (12.5%)	17.3	1 (20%)	2.7
De 65 à 69 ans	9 (18.8%)	27.8	0 (0%)	0
De 70 à 74 ans	7 (14.6%)	28.3	0 (0%)	0
De 75 à 79 ans	5 (10.4%)	29	1 (20%)	4.7
De 80 à 84 ans	2 (4.2%)	15.3	1 (20%)	5.3
Les 85 ans et plus	2 (4.2%)	17.4	0 (0%)	0

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	48	7.8	4.5	5	0.8	0.4

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000