

## Données du registre du cancer de l'Isère

### Larynx - 2019

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	1 (2%)	2.5	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	2 (4.1%)	4.5	1 (14.3%)	2.3
De 50 à 54 ans	2 (4.1%)	4.7	1 (14.3%)	2.3
De 55 à 59 ans	5 (10.2%)	12.7	2 (28.6%)	4.8
De 60 à 64 ans	9 (18.4%)	25.3	2 (28.6%)	5.2
De 65 à 69 ans	11 (22.4%)	34.5	1 (14.3%)	2.8
De 70 à 74 ans	7 (14.3%)	25.2	0 (0%)	0
De 75 à 79 ans	3 (6.1%)	16.3	0 (0%)	0
De 80 à 84 ans	4 (8.2%)	29.5	0 (0%)	0
Les 85 ans et plus	5 (10.2%)	40.9	0 (0%)	0

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>
Toutes classes d'âge	49	7.9	4.2	7	1.1	0.7

<sup>1</sup>Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000