

## Données du registre du cancer de l'Isère

### Larynx - 2020

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	2 (5.6%)	4.6	1 (9.1%)	2.3
De 50 à 54 ans	3 (8.3%)	7.1	0 (0%)	0
De 55 à 59 ans	2 (5.6%)	5	2 (18.2%)	4.8
De 60 à 64 ans	5 (13.9%)	13.9	3 (27.3%)	7.8
De 65 à 69 ans	6 (16.7%)	18.8	1 (9.1%)	2.8
De 70 à 74 ans	7 (19.4%)	24.1	2 (18.2%)	6
De 75 à 79 ans	7 (19.4%)	36.9	1 (9.1%)	4.3
De 80 à 84 ans	2 (5.6%)	14.7	0 (0%)	0
Les 85 ans et plus	2 (5.6%)	16.1	1 (9.1%)	3.9

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>
Toutes classes d'âge	36	5.8	2.9	11	1.7	0.9

<sup>1</sup>Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000