

Données du registre du cancer de l'Isère

LNH diffus à grandes cellules B - 2017

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	1 (2.2%)	2.8	1 (2.9%)	2.8
De 30 à 34 ans	3 (6.7%)	8	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	2 (4.4%)	5	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	1 (2.9%)	2.4
De 45 à 49 ans	2 (4.4%)	4.5	6 (17.1%)	13.6
De 50 à 54 ans	3 (6.7%)	7.1	0 (0%)	0
De 55 à 59 ans	5 (11.1%)	13.1	3 (8.6%)	7.5
De 60 à 64 ans	6 (13.3%)	17.3	1 (2.9%)	2.7
De 65 à 69 ans	7 (15.6%)	21.6	5 (14.3%)	14
De 70 à 74 ans	5 (11.1%)	20.2	5 (14.3%)	17.9
De 75 à 79 ans	4 (8.9%)	23.2	5 (14.3%)	23.5
De 80 à 84 ans	4 (8.9%)	30.5	4 (11.4%)	21.3
Les 85 ans et plus	3 (6.7%)	26.1	4 (11.4%)	16.5

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	45	7.3	4.4	35	5.4	2.8

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000