

Données du registre du cancer de l'Isère

LNH diffus à grandes cellules B - 2018

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	1 (2%)	2.6	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	2 (3.9%)	5.7	3 (7.7%)	8.5
De 30 à 34 ans	1 (2%)	2.7	1 (2.6%)	2.6
De 35 à 39 ans	1 (2%)	2.5	1 (2.6%)	2.4
De 40 à 44 ans	1 (2%)	2.5	2 (5.1%)	4.9
De 45 à 49 ans	3 (5.9%)	6.8	1 (2.6%)	2.3
De 50 à 54 ans	4 (7.8%)	9.3	1 (2.6%)	2.3
De 55 à 59 ans	4 (7.8%)	10.3	0 (0%)	0
De 60 à 64 ans	4 (7.8%)	11.4	3 (7.7%)	8
De 65 à 69 ans	5 (9.8%)	15.6	5 (12.8%)	14
De 70 à 74 ans	7 (13.7%)	26.6	5 (12.8%)	16.7
De 75 à 79 ans	3 (5.9%)	16.9	8 (20.5%)	36.9
De 80 à 84 ans	11 (21.6%)	82.9	3 (7.7%)	16
Les 85 ans et plus	4 (7.8%)	33.6	6 (15.4%)	24.2

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	51	8.2	4.6	39	6	3.2

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000