

## Données du registre du cancer de l'Isère

### LNH diffus à grandes cellules B - 2019

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	1 (1.7%)	2.3	1 (2%)	2.4
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	1 (1.7%)	2.9	1 (2%)	2.9
De 30 à 34 ans	1 (1.7%)	2.7	3 (6%)	7.8
De 35 à 39 ans	1 (1.7%)	2.5	1 (2%)	2.4
De 40 à 44 ans	1 (1.7%)	2.5	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	4 (6.7%)	9	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	1 (1.7%)	2.3	2 (4%)	4.7
De 55 à 59 ans	8 (13.3%)	20.2	3 (6%)	7.2
De 60 à 64 ans	3 (5%)	8.4	6 (12%)	15.7
De 65 à 69 ans	7 (11.7%)	22	10 (20%)	28
De 70 à 74 ans	12 (20%)	43.2	11 (22%)	34.8
De 75 à 79 ans	5 (8.3%)	27.2	3 (6%)	13.4
De 80 à 84 ans	7 (11.7%)	51.7	2 (4%)	10.7
Les 85 ans et plus	8 (13.3%)	65.4	7 (14%)	27.7

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>
Toutes classes d'âge	60	9.6	5.1	50	7.7	4.1

<sup>1</sup>Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000