

Données du registre du cancer de l'Isère

Levres - Bouche - Pharynx - 2018

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	1 (0.6%)	2.6	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	1 (1.6%)	2.8
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	2 (1.3%)	5	1 (1.6%)	2.4
De 40 à 44 ans	4 (2.5%)	10	1 (1.6%)	2.5
De 45 à 49 ans	3 (1.9%)	6.8	2 (3.2%)	4.5
De 50 à 54 ans	23 (14.6%)	53.7	5 (8.1%)	11.7
De 55 à 59 ans	26 (16.6%)	67.2	6 (9.7%)	14.8
De 60 à 64 ans	25 (15.9%)	71.2	9 (14.5%)	23.9
De 65 à 69 ans	28 (17.8%)	87.5	12 (19.4%)	33.6
De 70 à 74 ans	18 (11.5%)	68.5	6 (9.7%)	20.1
De 75 à 79 ans	10 (6.4%)	56.3	7 (11.3%)	32.3
De 80 à 84 ans	12 (7.6%)	90.4	3 (4.8%)	16
Les 85 ans et plus	5 (3.2%)	42	9 (14.5%)	36.4

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	157	25.3	14.9	62	9.6	4.9

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000