

Données du registre du cancer de l'Isère

Levres - Bouche - Pharynx - 2020

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	1 (1.7%)	2.6
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	2 (3.4%)	4.9
De 45 à 49 ans	6 (4.4%)	13.7	3 (5.1%)	6.9
De 50 à 54 ans	11 (8.1%)	25.9	4 (6.8%)	9.3
De 55 à 59 ans	21 (15.6%)	52.1	5 (8.5%)	11.9
De 60 à 64 ans	24 (17.8%)	66.5	5 (8.5%)	13
De 65 à 69 ans	22 (16.3%)	69	11 (18.6%)	30.8
De 70 à 74 ans	22 (16.3%)	75.7	12 (20.3%)	36.2
De 75 à 79 ans	16 (11.9%)	84.3	4 (6.8%)	17.3
De 80 à 84 ans	9 (6.7%)	66.1	2 (3.4%)	10.8
Les 85 ans et plus	4 (3%)	32.3	10 (16.9%)	39.2

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	135	21.6	11.8	59	9	4.4

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000