

Données du registre du cancer de l'Isère

LNH diffus à grandes cellules B - 2010

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	1 (2.6%)	2.5	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	1 (2.6%)	2.4	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	1 (2.5%)	2.6
De 35 à 39 ans	1 (2.6%)	2.3	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	2 (5.1%)	4.6	4 (10%)	9.2
De 45 à 49 ans	3 (7.7%)	7.1	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	3 (7.7%)	7.8	3 (7.5%)	7.6
De 55 à 59 ans	2 (5.1%)	5.5	4 (10%)	10.5
De 60 à 64 ans	3 (7.7%)	8.8	4 (10%)	11.2
De 65 à 69 ans	2 (5.1%)	8.3	4 (10%)	15.7
De 70 à 74 ans	6 (15.4%)	31.2	4 (10%)	17.9
De 75 à 79 ans	6 (15.4%)	36.6	7 (17.5%)	32.2
De 80 à 84 ans	5 (12.8%)	44	4 (10%)	21.7
Les 85 ans et plus	4 (10.3%)	50	5 (12.5%)	28.3

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	39	6.5	3.9	40	6.5	3.4

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000