

Données du registre du cancer de l'Isère

LNH diffus à grandes cellules B - 2014

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	1 (2.9%)	2.4	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	1 (2.6%)	2.6
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	2 (5.1%)	5
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	2 (5.7%)	4.5	4 (10.3%)	9
De 45 à 49 ans	2 (5.7%)	4.6	1 (2.6%)	2.3
De 50 à 54 ans	0 (0%)	0	1 (2.6%)	2.4
De 55 à 59 ans	5 (14.3%)	13.5	4 (10.3%)	10.3
De 60 à 64 ans	5 (14.3%)	14.6	2 (5.1%)	5.4
De 65 à 69 ans	4 (11.4%)	13.1	3 (7.7%)	9
De 70 à 74 ans	2 (5.7%)	9.4	5 (12.8%)	21
De 75 à 79 ans	5 (14.3%)	29.9	4 (10.3%)	19
De 80 à 84 ans	6 (17.1%)	47.7	4 (10.3%)	21.1
Les 85 ans et plus	3 (8.6%)	30.5	8 (20.5%)	36.9

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	35	5.7	3.1	39	6.1	3.1

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000