

Données du registre du cancer de l'Isère

LNH diffus à grandes cellules B - 2016

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	1 (2%)	2.5	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	1 (2%)	2.6	1 (2.3%)	2.5
De 35 à 39 ans	2 (3.9%)	5.1	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	1 (2.3%)	2.4
De 45 à 49 ans	1 (2%)	2.3	1 (2.3%)	2.3
De 50 à 54 ans	4 (7.8%)	9.5	5 (11.4%)	11.8
De 55 à 59 ans	6 (11.8%)	15.9	2 (4.5%)	5.1
De 60 à 64 ans	6 (11.8%)	17.4	9 (20.5%)	24.2
De 65 à 69 ans	3 (5.9%)	9.2	2 (4.5%)	5.6
De 70 à 74 ans	10 (19.6%)	43.3	5 (11.4%)	19.2
De 75 à 79 ans	9 (17.6%)	53	8 (18.2%)	37.9
De 80 à 84 ans	6 (11.8%)	46.1	5 (11.4%)	26.7
Les 85 ans et plus	2 (3.9%)	18.5	5 (11.4%)	21.4

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	51	8.3	4.6	44	6.9	3.4

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000