

Données du registre du cancer de l'Isère

LNH folliculaire - 2010

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	1 (3.7%)	2.7	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	1 (3.7%)	2.3	1 (3.4%)	2.3
De 40 à 44 ans	2 (7.4%)	4.6	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	2 (7.4%)	4.7	1 (3.4%)	2.3
De 50 à 54 ans	2 (7.4%)	5.2	0 (0%)	0
De 55 à 59 ans	2 (7.4%)	5.5	2 (6.9%)	5.3
De 60 à 64 ans	4 (14.8%)	11.8	4 (13.8%)	11.2
De 65 à 69 ans	6 (22.2%)	25	6 (20.7%)	23.6
De 70 à 74 ans	2 (7.4%)	10.4	5 (17.2%)	22.4
De 75 à 79 ans	2 (7.4%)	12.2	4 (13.8%)	18.4
De 80 à 84 ans	0 (0%)	0	3 (10.3%)	16.3
Les 85 ans et plus	3 (11.1%)	37.5	3 (10.3%)	17

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	27	4.5	3.1	29	4.7	2.4

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000