

Données du registre du cancer de l'Isère

LNH folliculaire - 2011

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	3 (10.7%)	6.9
De 45 à 49 ans	0 (0%)	0	3 (10.7%)	7
De 50 à 54 ans	3 (13%)	7.7	4 (14.3%)	10
De 55 à 59 ans	4 (17.4%)	11.1	5 (17.9%)	13.1
De 60 à 64 ans	4 (17.4%)	11.5	2 (7.1%)	5.4
De 65 à 69 ans	3 (13%)	11.8	1 (3.6%)	3.7
De 70 à 74 ans	4 (17.4%)	20.6	3 (10.7%)	13.4
De 75 à 79 ans	3 (13%)	18.3	3 (10.7%)	14
De 80 à 84 ans	2 (8.7%)	17.1	1 (3.6%)	5.3
Les 85 ans et plus	0 (0%)	0	3 (10.7%)	16

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	23	3.8	2.3	28	4.5	2.7

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000