

Données du registre du cancer de l'Isère

LNH folliculaire - 2013

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	1 (3.6%)	2.6	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	1 (4%)	2.5
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	3 (10.7%)	6.9	2 (8%)	4.6
De 50 à 54 ans	2 (7.1%)	5	3 (12%)	7.3
De 55 à 59 ans	5 (17.9%)	13.6	4 (16%)	10.3
De 60 à 64 ans	2 (7.1%)	5.8	8 (32%)	21.6
De 65 à 69 ans	7 (25%)	24.1	4 (16%)	12.7
De 70 à 74 ans	4 (14.3%)	19.6	1 (4%)	4.3
De 75 à 79 ans	1 (3.6%)	6.1	0 (0%)	0
De 80 à 84 ans	2 (7.1%)	16.2	2 (8%)	10.5
Les 85 ans et plus	1 (3.6%)	10.7	0 (0%)	0

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	28	4.6	2.9	25	4	2.6

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000