

Données du registre du cancer de l'Isère

Larynx - 2012

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	4 (6.3%)	9	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	5 (7.9%)	11.5	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	10 (15.9%)	25.4	0 (0%)	0
De 55 à 59 ans	11 (17.5%)	30.2	0 (0%)	0
De 60 à 64 ans	7 (11.1%)	20.2	1 (33.3%)	2.7
De 65 à 69 ans	10 (15.9%)	36.7	1 (33.3%)	3.4
De 70 à 74 ans	7 (11.1%)	35.4	1 (33.3%)	4.4
De 75 à 79 ans	5 (7.9%)	30.6	0 (0%)	0
De 80 à 84 ans	3 (4.8%)	24.9	0 (0%)	0
Les 85 ans et plus	1 (1.6%)	11.1	0 (0%)	0

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	63	10.4	6.8	3	0.5	0.3

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000