

Données du registre du cancer de l'Isère

Larynx - 2014

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	1 (11.1%)	2.5
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	3 (6.4%)	6.9	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	3 (6.4%)	7.4	1 (11.1%)	2.4
De 55 à 59 ans	8 (17%)	21.6	2 (22.2%)	5.1
De 60 à 64 ans	8 (17%)	23.3	2 (22.2%)	5.4
De 65 à 69 ans	11 (23.4%)	36	0 (0%)	0
De 70 à 74 ans	6 (12.8%)	28.2	1 (11.1%)	4.2
De 75 à 79 ans	2 (4.3%)	11.9	0 (0%)	0
De 80 à 84 ans	5 (10.6%)	39.7	0 (0%)	0
Les 85 ans et plus	1 (2.1%)	10.2	2 (22.2%)	9.2

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	47	7.7	4.6	9	1.4	0.8

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000