

Données du registre du cancer de l'Isère

LLC / Lymphome lymphocytaire - 2019

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	1 (2.3%)	2.3	1 (2.9%)	2.3
De 50 à 54 ans	1 (2.3%)	2.3	2 (5.7%)	4.7
De 55 à 59 ans	6 (14%)	15.2	2 (5.7%)	4.8
De 60 à 64 ans	8 (18.6%)	22.5	6 (17.1%)	15.7
De 65 à 69 ans	10 (23.3%)	31.4	3 (8.6%)	8.4
De 70 à 74 ans	7 (16.3%)	25.2	7 (20%)	22.2
De 75 à 79 ans	2 (4.7%)	10.9	3 (8.6%)	13.4
De 80 à 84 ans	4 (9.3%)	29.5	5 (14.3%)	26.7
Les 85 ans et plus	4 (9.3%)	32.7	6 (17.1%)	23.7

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	43	6.9	3.6	35	5.4	2.3

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000