

Données du registre du cancer de l'Isère

Levres - Bouche - Pharynx - 2010

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	1 (2.4%)	2.7
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	1 (2.4%)	2.6
De 35 à 39 ans	2 (1.5%)	4.7	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	3 (2.2%)	6.9	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	15 (11.1%)	35.5	3 (7.1%)	7
De 50 à 54 ans	18 (13.3%)	46.9	4 (9.5%)	10.1
De 55 à 59 ans	30 (22.2%)	83.1	5 (11.9%)	13.1
De 60 à 64 ans	23 (17%)	67.6	6 (14.3%)	16.7
De 65 à 69 ans	12 (8.9%)	49.9	5 (11.9%)	19.7
De 70 à 74 ans	10 (7.4%)	52	6 (14.3%)	26.9
De 75 à 79 ans	10 (7.4%)	61	4 (9.5%)	18.4
De 80 à 84 ans	5 (3.7%)	44	5 (11.9%)	27.1
Les 85 ans et plus	7 (5.2%)	87.5	2 (4.8%)	11.3

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	135	22.7	15	42	6.8	4

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000