

Données du registre du cancer de l'Isère

Levres - Bouche - Pharynx - 2011

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	1 (2%)	2.7
De 30 à 34 ans	1 (0.7%)	2.6	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	1 (2%)	2.4
De 40 à 44 ans	9 (6%)	20.4	1 (2%)	2.3
De 45 à 49 ans	9 (6%)	21	3 (5.9%)	7
De 50 à 54 ans	23 (15.4%)	59.2	5 (9.8%)	12.6
De 55 à 59 ans	26 (17.4%)	72	6 (11.8%)	15.7
De 60 à 64 ans	31 (20.8%)	89	12 (23.5%)	32.4
De 65 à 69 ans	19 (12.8%)	75	9 (17.6%)	33.4
De 70 à 74 ans	14 (9.4%)	72	2 (3.9%)	9
De 75 à 79 ans	5 (3.4%)	30.5	3 (5.9%)	14
De 80 à 84 ans	6 (4%)	51.2	4 (7.8%)	21.3
Les 85 ans et plus	6 (4%)	69.5	4 (7.8%)	21.4

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	149	24.8	16.6	51	8.2	5

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000