

Données du registre du cancer de l'Isère

Levres - Bouche - Pharynx - 2012

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	1 (1.8%)	2.8
De 30 à 34 ans	2 (1.3%)	5.2	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	3 (2%)	7.4	2 (3.5%)	4.9
De 40 à 44 ans	2 (1.3%)	4.5	1 (1.8%)	2.3
De 45 à 49 ans	6 (3.9%)	13.8	4 (7%)	9.3
De 50 à 54 ans	19 (12.5%)	48.2	9 (15.8%)	22.3
De 55 à 59 ans	22 (14.5%)	60.5	7 (12.3%)	18.1
De 60 à 64 ans	29 (19.1%)	83.9	5 (8.8%)	13.5
De 65 à 69 ans	28 (18.4%)	102.9	9 (15.8%)	30.8
De 70 à 74 ans	16 (10.5%)	81	5 (8.8%)	22.2
De 75 à 79 ans	14 (9.2%)	85.8	6 (10.5%)	28.3
De 80 à 84 ans	8 (5.3%)	66.3	5 (8.8%)	26.6
Les 85 ans et plus	3 (2%)	33.3	3 (5.3%)	15.3

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	152	25.1	16.1	57	9.1	5.4

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000