

Données du registre du cancer de l'Isère

Levres - Bouche - Pharynx - 2013

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	1 (0.7%)	2.4	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	1 (0.7%)	2.4	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	1 (1.7%)	2.8
De 30 à 34 ans	2 (1.4%)	5.1	1 (1.7%)	2.5
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	3 (2.1%)	6.7	3 (5.1%)	6.7
De 45 à 49 ans	10 (7.1%)	22.9	3 (5.1%)	6.9
De 50 à 54 ans	17 (12.1%)	42.4	3 (5.1%)	7.3
De 55 à 59 ans	21 (14.9%)	57.2	11 (18.6%)	28.5
De 60 à 64 ans	28 (19.9%)	81.6	6 (10.2%)	16.2
De 65 à 69 ans	23 (16.3%)	79.2	6 (10.2%)	19
De 70 à 74 ans	10 (7.1%)	49.1	5 (8.5%)	21.7
De 75 à 79 ans	9 (6.4%)	54.8	8 (13.6%)	38
De 80 à 84 ans	11 (7.8%)	89.3	6 (10.2%)	31.6
Les 85 ans et plus	5 (3.5%)	53.4	6 (10.2%)	29.1

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	141	23.1	14.8	59	9.4	5

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000