

Données du registre du cancer de l'Isère

Levres - Bouche - Pharynx - 2014

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	1 (2.1%)	2.7
De 30 à 34 ans	1 (0.8%)	2.6	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	2 (1.6%)	5.1	1 (2.1%)	2.5
De 40 à 44 ans	3 (2.5%)	6.7	2 (4.3%)	4.5
De 45 à 49 ans	5 (4.1%)	11.5	2 (4.3%)	4.6
De 50 à 54 ans	10 (8.2%)	24.5	3 (6.4%)	7.2
De 55 à 59 ans	26 (21.3%)	70.2	6 (12.8%)	15.4
De 60 à 64 ans	22 (18%)	64	10 (21.3%)	27
De 65 à 69 ans	22 (18%)	72.1	7 (14.9%)	21
De 70 à 74 ans	8 (6.6%)	37.6	5 (10.6%)	21
De 75 à 79 ans	10 (8.2%)	59.7	4 (8.5%)	19
De 80 à 84 ans	8 (6.6%)	63.6	3 (6.4%)	15.8
Les 85 ans et plus	5 (4.1%)	50.9	3 (6.4%)	13.9

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	122	19.9	12.2	47	7.4	4.4

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000