

Données du registre du cancer de l'Isère

Levres - Bouche - Pharynx - 2015

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	1 (1.7%)	2.5
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	1 (0.7%)	2.5	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	1 (0.7%)	2.6	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	1 (0.7%)	2.6	1 (1.7%)	2.5
De 40 à 44 ans	2 (1.3%)	4.5	3 (5%)	6.9
De 45 à 49 ans	12 (8%)	27.6	2 (3.3%)	4.6
De 50 à 54 ans	15 (10%)	36.2	4 (6.7%)	9.5
De 55 à 59 ans	22 (14.7%)	58.8	13 (21.7%)	33.2
De 60 à 64 ans	32 (21.3%)	93.1	10 (16.7%)	27
De 65 à 69 ans	19 (12.7%)	59.5	3 (5%)	8.6
De 70 à 74 ans	17 (11.3%)	77.3	7 (11.7%)	28.5
De 75 à 79 ans	6 (4%)	35.5	6 (10%)	28.4
De 80 à 84 ans	14 (9.3%)	108.7	4 (6.7%)	21.4
Les 85 ans et plus	8 (5.3%)	77.9	6 (10%)	26.6

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	150	24.4	14.9	60	9.4	5.3

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000