

Données du registre du cancer de l'Isère

Levres - Bouche - Pharynx - 2016

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	1 (0.7%)	2.5	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	2 (1.4%)	5.3	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	1 (0.7%)	2.5	2 (3.1%)	5
De 40 à 44 ans	6 (4.1%)	14	1 (1.6%)	2.4
De 45 à 49 ans	5 (3.4%)	11.4	2 (3.1%)	4.6
De 50 à 54 ans	13 (8.8%)	31	7 (10.9%)	16.5
De 55 à 59 ans	24 (16.3%)	63.5	8 (12.5%)	20.3
De 60 à 64 ans	28 (19%)	81.4	12 (18.8%)	32.3
De 65 à 69 ans	18 (12.2%)	55.1	8 (12.5%)	22.3
De 70 à 74 ans	23 (15.6%)	99.5	9 (14.1%)	34.6
De 75 à 79 ans	12 (8.2%)	70.6	4 (6.2%)	18.9
De 80 à 84 ans	7 (4.8%)	53.8	1 (1.6%)	5.3
Les 85 ans et plus	7 (4.8%)	64.6	10 (15.6%)	42.8

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	147	23.8	14.5	64	10	5.4

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000