

Données du registre du cancer de l'Isère

LNH folliculaire - 2017

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	1 (2.6%)	2.7	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	1 (2.6%)	2.5	1 (3.8%)	2.4
De 40 à 44 ans	1 (2.6%)	2.4	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	4 (10.5%)	9.1	4 (15.4%)	9.1
De 50 à 54 ans	6 (15.8%)	14.1	2 (7.7%)	4.7
De 55 à 59 ans	4 (10.5%)	10.5	3 (11.5%)	7.5
De 60 à 64 ans	2 (5.3%)	5.8	4 (15.4%)	10.7
De 65 à 69 ans	9 (23.7%)	27.8	2 (7.7%)	5.6
De 70 à 74 ans	2 (5.3%)	8.1	5 (19.2%)	17.9
De 75 à 79 ans	2 (5.3%)	11.6	2 (7.7%)	9.4
De 80 à 84 ans	2 (5.3%)	15.3	1 (3.8%)	5.3
Les 85 ans et plus	4 (10.5%)	34.9	2 (7.7%)	8.3

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	38	6.1	3.7	26	4	2.3

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000