

Données du registre du cancer de l'Isère

LNH folliculaire - 2018

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	1 (3.2%)	2.8
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	1 (5%)	2.5	1 (3.2%)	2.5
De 45 à 49 ans	2 (10%)	4.5	4 (12.9%)	9
De 50 à 54 ans	1 (5%)	2.3	3 (9.7%)	7
De 55 à 59 ans	2 (10%)	5.2	3 (9.7%)	7.4
De 60 à 64 ans	2 (10%)	5.7	0 (0%)	0
De 65 à 69 ans	5 (25%)	15.6	4 (12.9%)	11.2
De 70 à 74 ans	5 (25%)	19	8 (25.8%)	26.7
De 75 à 79 ans	2 (10%)	11.3	1 (3.2%)	4.6
De 80 à 84 ans	0 (0%)	0	4 (12.9%)	21.3
Les 85 ans et plus	0 (0%)	0	2 (6.5%)	8.1

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	20	3.2	1.9	31	4.8	2.6

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000