

Données du registre du cancer de l'Isère

LNH folliculaire - 2019

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	2 (6.7%)	5	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	2 (6.7%)	5.1	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	1 (3.3%)	2.3	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	1 (3.3%)	2.3	2 (6.9%)	4.7
De 55 à 59 ans	3 (10%)	7.6	2 (6.9%)	4.8
De 60 à 64 ans	1 (3.3%)	2.8	5 (17.2%)	13.1
De 65 à 69 ans	5 (16.7%)	15.7	8 (27.6%)	22.4
De 70 à 74 ans	4 (13.3%)	14.4	8 (27.6%)	25.3
De 75 à 79 ans	6 (20%)	32.6	0 (0%)	0
De 80 à 84 ans	3 (10%)	22.2	4 (13.8%)	21.4
Les 85 ans et plus	2 (6.7%)	16.3	0 (0%)	0

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	30	4.8	2.5	29	4.5	2.2

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000