

Données du registre du cancer de l'Isère

Lymphome de Burkitt - 2010

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	2 (50%)	4.9	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	1 (50%)	2.6
De 15 à 19 ans	1 (25%)	2.5	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 55 à 59 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 60 à 64 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 65 à 69 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 70 à 74 ans	1 (25%)	5.2	1 (50%)	4.5
De 75 à 79 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 80 à 84 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
Les 85 ans et plus	0 (0%)	0	0 (0%)	0

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	4	0.7	0.9	2	0.3	0.3

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000