

Données du registre du cancer de l'Isère

Lymphome de Hodgkin - 2010

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	1 (5%)	2.6
De 10 à 14 ans	2 (7.4%)	5	1 (5%)	2.6
De 15 à 19 ans	4 (14.8%)	10	2 (10%)	5.3
De 20 à 24 ans	4 (14.8%)	9.6	1 (5%)	2.6
De 25 à 29 ans	4 (14.8%)	10.6	3 (15%)	8.1
De 30 à 34 ans	3 (11.1%)	8	1 (5%)	2.6
De 35 à 39 ans	1 (3.7%)	2.3	2 (10%)	4.6
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	3 (15%)	6.9
De 45 à 49 ans	1 (3.7%)	2.4	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	2 (7.4%)	5.2	2 (10%)	5.1
De 55 à 59 ans	2 (7.4%)	5.5	1 (5%)	2.6
De 60 à 64 ans	1 (3.7%)	2.9	0 (0%)	0
De 65 à 69 ans	1 (3.7%)	4.2	0 (0%)	0
De 70 à 74 ans	0 (0%)	0	2 (10%)	9
De 75 à 79 ans	1 (3.7%)	6.1	1 (5%)	4.6
De 80 à 84 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
Les 85 ans et plus	1 (3.7%)	12.5	0 (0%)	0

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	27	4.5	4.6	20	3.3	3.3

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000