

Données du registre du cancer de l'Isère

Lymphome de Hodgkin - 2011

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	1 (4%)	2.4	1 (5.3%)	2.6
De 15 à 19 ans	1 (4%)	2.5	1 (5.3%)	2.7
De 20 à 24 ans	1 (4%)	2.4	2 (10.5%)	5.2
De 25 à 29 ans	3 (12%)	8	3 (15.8%)	8.2
De 30 à 34 ans	2 (8%)	5.3	3 (15.8%)	7.8
De 35 à 39 ans	1 (4%)	2.4	1 (5.3%)	2.4
De 40 à 44 ans	2 (8%)	4.5	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	1 (4%)	2.3	2 (10.5%)	4.7
De 50 à 54 ans	4 (16%)	10.3	2 (10.5%)	5
De 55 à 59 ans	1 (4%)	2.8	0 (0%)	0
De 60 à 64 ans	3 (12%)	8.6	1 (5.3%)	2.7
De 65 à 69 ans	2 (8%)	7.9	0 (0%)	0
De 70 à 74 ans	0 (0%)	0	1 (5.3%)	4.5
De 75 à 79 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 80 à 84 ans	2 (8%)	17.1	1 (5.3%)	5.3
Les 85 ans et plus	1 (4%)	11.6	1 (5.3%)	5.3

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	25	4.2	3.5	19	3.1	2.9

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000