

Données du registre du cancer de l'Isère

Lymphome de Hodgkin - 2016

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	3 (12.5%)	7	1 (5.3%)	2.5
De 15 à 19 ans	1 (4.2%)	2.4	3 (15.8%)	7.7
De 20 à 24 ans	1 (4.2%)	2.5	1 (5.3%)	2.8
De 25 à 29 ans	2 (8.3%)	5.5	3 (15.8%)	8.4
De 30 à 34 ans	5 (20.8%)	13.2	1 (5.3%)	2.5
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	1 (5.3%)	2.5
De 40 à 44 ans	3 (12.5%)	7	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	2 (8.3%)	4.6	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	0 (0%)	0	1 (5.3%)	2.4
De 55 à 59 ans	2 (8.3%)	5.3	3 (15.8%)	7.6
De 60 à 64 ans	2 (8.3%)	5.8	1 (5.3%)	2.7
De 65 à 69 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 70 à 74 ans	0 (0%)	0	1 (5.3%)	3.8
De 75 à 79 ans	2 (8.3%)	11.8	0 (0%)	0
De 80 à 84 ans	1 (4.2%)	7.7	1 (5.3%)	5.3
Les 85 ans et plus	0 (0%)	0	2 (10.5%)	8.6

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	24	3.9	3.6	19	3	2.8

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000