

Données du registre du cancer de l'Isère

Lymphome de Hodgkin - 2019

Mise à jour le 2024-08-28

| | Hommes | | Femmes | |
|------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | Nombre de cas (%) | TI brut | Nombre de cas (%) | TI brut |
| Répartition par classe d'âge | | | | |
| De 0 à 4 ans | 0 (0%) | 0 | 0 (0%) | 0 |
| De 5 à 9 ans | 1 (3.7%) | 2.4 | 0 (0%) | 0 |
| De 10 à 14 ans | 0 (0%) | 0 | 0 (0%) | 0 |
| De 15 à 19 ans | 4 (14.8%) | 9.1 | 4 (18.2%) | 9.8 |
| De 20 à 24 ans | 4 (14.8%) | 10 | 2 (9.1%) | 5.4 |
| De 25 à 29 ans | 4 (14.8%) | 11.4 | 3 (13.6%) | 8.7 |
| De 30 à 34 ans | 2 (7.4%) | 5.4 | 1 (4.5%) | 2.6 |
| De 35 à 39 ans | 1 (3.7%) | 2.5 | 1 (4.5%) | 2.4 |
| De 40 à 44 ans | 0 (0%) | 0 | 3 (13.6%) | 7.5 |
| De 45 à 49 ans | 0 (0%) | 0 | 0 (0%) | 0 |
| De 50 à 54 ans | 4 (14.8%) | 9.4 | 1 (4.5%) | 2.3 |
| De 55 à 59 ans | 1 (3.7%) | 2.5 | 2 (9.1%) | 4.8 |
| De 60 à 64 ans | 0 (0%) | 0 | 2 (9.1%) | 5.2 |
| De 65 à 69 ans | 3 (11.1%) | 9.4 | 1 (4.5%) | 2.8 |
| De 70 à 74 ans | 1 (3.7%) | 3.6 | 1 (4.5%) | 3.2 |
| De 75 à 79 ans | 1 (3.7%) | 5.4 | 0 (0%) | 0 |
| De 80 à 84 ans | 1 (3.7%) | 7.4 | 1 (4.5%) | 5.3 |
| Les 85 ans et plus | 0 (0%) | 0 | 0 (0%) | 0 |

| | Hommes | | | Femmes | | |
|----------------------|---------------|---------|-----------------------------|---------------|---------|-----------------------------|
| | Nombre de cas | TI brut | TI standardisé ¹ | Nombre de cas | TI brut | TI standardisé ¹ |
| Toutes classes d'âge | 27 | 4.3 | 4.3 | 22 | 3.4 | 3.5 |

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000