

Données du registre du cancer de l'Isère

Lymphome de Hodgkin - 2020

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	1 (3.1%)	2.4	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	2 (11.1%)	4.8
De 15 à 19 ans	2 (6.2%)	4.5	2 (11.1%)	4.9
De 20 à 24 ans	2 (6.2%)	4.9	2 (11.1%)	5.4
De 25 à 29 ans	8 (25%)	22.9	1 (5.6%)	2.9
De 30 à 34 ans	3 (9.4%)	8.2	1 (5.6%)	2.6
De 35 à 39 ans	3 (9.4%)	7.6	3 (16.7%)	7.2
De 40 à 44 ans	1 (3.1%)	2.5	1 (5.6%)	2.5
De 45 à 49 ans	2 (6.2%)	4.6	1 (5.6%)	2.3
De 50 à 54 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 55 à 59 ans	0 (0%)	0	2 (11.1%)	4.8
De 60 à 64 ans	3 (9.4%)	8.3	1 (5.6%)	2.6
De 65 à 69 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 70 à 74 ans	5 (15.6%)	17.2	1 (5.6%)	3
De 75 à 79 ans	0 (0%)	0	1 (5.6%)	4.3
De 80 à 84 ans	1 (3.1%)	7.3	0 (0%)	0
Les 85 ans et plus	1 (3.1%)	8.1	0 (0%)	0

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	32	5.1	5	18	2.8	2.8

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000