

Données du registre du cancer de l'Isère

Mésothéliome de la pleure - 2017

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	1 (3.8%)	2.4	0 (0%)	0
De 55 à 59 ans	2 (7.7%)	5.3	0 (0%)	0
De 60 à 64 ans	3 (11.5%)	8.7	2 (50%)	5.4
De 65 à 69 ans	3 (11.5%)	9.3	0 (0%)	0
De 70 à 74 ans	3 (11.5%)	12.1	0 (0%)	0
De 75 à 79 ans	5 (19.2%)	29	0 (0%)	0
De 80 à 84 ans	3 (11.5%)	22.9	0 (0%)	0
Les 85 ans et plus	6 (23.1%)	52.3	2 (50%)	8.3

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	26	4.2	1.9	4	0.6	0.3

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000