

Données du registre du cancer de l'Isère

Syndrome myéloprolifératif chronique (SMC), autre que LMC - 2018

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	1 (2.3%)	2.8
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	1 (2.3%)	2.8
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	2 (4.5%)	5.1
De 35 à 39 ans	1 (2.9%)	2.5	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	2 (5.9%)	5	2 (4.5%)	4.9
De 45 à 49 ans	1 (2.9%)	2.3	1 (2.3%)	2.3
De 50 à 54 ans	1 (2.9%)	2.3	0 (0%)	0
De 55 à 59 ans	1 (2.9%)	2.6	2 (4.5%)	4.9
De 60 à 64 ans	6 (17.6%)	17.1	3 (6.8%)	8
De 65 à 69 ans	5 (14.7%)	15.6	3 (6.8%)	8.4
De 70 à 74 ans	5 (14.7%)	19	7 (15.9%)	23.4
De 75 à 79 ans	6 (17.6%)	33.8	9 (20.5%)	41.5
De 80 à 84 ans	2 (5.9%)	15.1	6 (13.6%)	32
Les 85 ans et plus	4 (11.8%)	33.6	7 (15.9%)	28.3

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	34	5.5	2.9	44	6.8	3.1

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000