

Données du registre du cancer de l'Isère

Syndrome myéloprolifératif chronique (SMC), autre que LMC - 2019

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	1 (2.1%)	2.7	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	1 (1.9%)	2.7
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	1 (2.1%)	2.7	2 (3.8%)	5.2
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	1 (2.1%)	2.5	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	2 (4.2%)	4.5	1 (1.9%)	2.3
De 50 à 54 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 55 à 59 ans	2 (4.2%)	5.1	3 (5.7%)	7.2
De 60 à 64 ans	8 (16.7%)	22.5	4 (7.5%)	10.5
De 65 à 69 ans	12 (25%)	37.7	5 (9.4%)	14
De 70 à 74 ans	8 (16.7%)	28.8	8 (15.1%)	25.3
De 75 à 79 ans	8 (16.7%)	43.5	9 (17%)	40.3
De 80 à 84 ans	2 (4.2%)	14.8	10 (18.9%)	53.4
Les 85 ans et plus	3 (6.2%)	24.5	10 (18.9%)	39.5

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	48	7.7	4.4	53	8.2	3.2

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000