

Données du registre du cancer de l'Isère

Syndrome myéloprolifératif chronique (SMC), autre que LMC - 2020

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	1 (2.3%)	2.7
De 25 à 29 ans	1 (2%)	2.9	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	1 (2%)	2.7	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	1 (2.3%)	2.4
De 40 à 44 ans	2 (4.1%)	5	3 (7%)	7.4
De 45 à 49 ans	2 (4.1%)	4.6	1 (2.3%)	2.3
De 50 à 54 ans	3 (6.1%)	7.1	2 (4.7%)	4.7
De 55 à 59 ans	4 (8.2%)	9.9	3 (7%)	7.2
De 60 à 64 ans	9 (18.4%)	25	5 (11.6%)	13
De 65 à 69 ans	8 (16.3%)	25.1	3 (7%)	8.4
De 70 à 74 ans	4 (8.2%)	13.8	5 (11.6%)	15.1
De 75 à 79 ans	5 (10.2%)	26.3	5 (11.6%)	21.6
De 80 à 84 ans	8 (16.3%)	58.8	8 (18.6%)	43
Les 85 ans et plus	2 (4.1%)	16.1	6 (14%)	23.5

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	49	7.8	4.4	43	6.6	3.1

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000