

## Données du registre du cancer de l'Isère

### Testicule - 2015

Mise à jour le 2023-07-12

#### Hommes

|                              | Nombre de cas (%) | TI brut |
|------------------------------|-------------------|---------|
| Répartition par classe d'âge |                   |         |
| De 0 à 4 ans                 | 0 (0%)            | 0       |
| De 5 à 9 ans                 | 0 (0%)            | 0       |
| De 10 à 14 ans               | 0 (0%)            | 0       |
| De 15 à 19 ans               | 0 (0%)            | 0       |
| De 20 à 24 ans               | 5 (10.2%)         | 12.5    |
| De 25 à 29 ans               | 11 (22.4%)        | 30      |
| De 30 à 34 ans               | 12 (24.5%)        | 31.1    |
| De 35 à 39 ans               | 7 (14.3%)         | 18      |
| De 40 à 44 ans               | 10 (20.4%)        | 22.7    |
| De 45 à 49 ans               | 1 (2%)            | 2.3     |
| De 50 à 54 ans               | 1 (2%)            | 2.4     |
| De 55 à 59 ans               | 1 (2%)            | 2.7     |
| De 60 à 64 ans               | 0 (0%)            | 0       |
| De 65 à 69 ans               | 0 (0%)            | 0       |
| De 70 à 74 ans               | 1 (2%)            | 4.5     |
| De 75 à 79 ans               | 0 (0%)            | 0       |
| De 80 à 84 ans               | 0 (0%)            | 0       |
| Les 85 ans et plus           | 0 (0%)            | 0       |

#### Hommes

|                      | Nombre de cas | TI brut | TI standardisé <sup>1</sup> |
|----------------------|---------------|---------|-----------------------------|
| Toutes classes d'âge | 49            | 8       | 8.2                         |

<sup>1</sup>Standardisé sur la population masculine mondiale  
TI : Taux d'incidence pour 100 000