

Données du registre du cancer de l'Isère

Femmes - Année 2020

Mise à jour le 2024-08-29

| | Nombre de cas | TI brut | TI standardisé ¹ |
|---|---------------|---------|-----------------------------|
| Tumeurs solides | | | |
| Sein | 1122 | 171.9 | 102.0 |
| Colon - Rectum | 287 | 44.0 | 17.7 |
| Poumon | 252 | 38.6 | 19.1 |
| Mélanome de la peau | 157 | 24.1 | 14.9 |
| Pancréas | 140 | 21.4 | 7.9 |
| Thyroïde | 133 | 20.4 | 14.5 |
| Système nerveux central non invasif | 111 | 17.0 | 10.3 |
| Corps de l'utérus | 101 | 15.5 | 6.7 |
| Ovaire | 101 | 15.5 | 8.0 |
| Levres - Bouche - Pharynx | 59 | 9.0 | 4.4 |
| Rein | 53 | 8.1 | 4.3 |
| Vessie | 53 | 8.1 | 2.8 |
| Système nerveux central invasif | 50 | 7.7 | 4.7 |
| Sarcomes | 48 | 7.4 | 4.3 |
| Estomac | 47 | 7.2 | 2.9 |
| Foie | 42 | 6.4 | 2.6 |
| Site primitif inconnu | 41 | 6.3 | 2.0 |
| Anus - Canal anal | 32 | 4.9 | 2.6 |
| Col de l'utérus | 32 | 4.9 | 3.7 |
| Vésicule et voies biliaires | 30 | 4.6 | 1.7 |
| Oesophage | 21 | 3.2 | 1.3 |
| Larynx | 11 | 1.7 | 0.9 |
| Intestin grele | 10 | 1.5 | 0.7 |
| Mélanome de l'uvéa | 9 | 1.4 | 0.7 |
| Vulve | 9 | 1.4 | 0.7 |
| Fosses nasales, sinus annexes de la face, oreilles moyenne et interne | 6 | 0.9 | 0.6 |
| Voies excrétrices urinaires | 6 | 0.9 | 0.4 |
| Mésothéliome de la plèvre | 5 | 0.8 | 0.4 |
| Vagin | 4 | 0.6 | 0.3 |

¹Standardisé sur la population féminine mondiale

TI : Taux d'incidence pour 100 000

| | Nombre de cas | TI brut | TI standardisé ¹ |
|---|---------------|---------|-----------------------------|
| Hémopathies malignes | | | |
| Myélome multiple et plasmocytome | 45 | 6.9 | 2.4 |
| Syndrome myéloprolifératif chronique (SMC), autre que LMC | 43 | 6.6 | 3.1 |
| LNH diffus à grandes cellules B | 36 | 5.5 | 2.8 |
| LLC / Lymphome lymphocytaire | 31 | 4.7 | 2.2 |
| Syndromes myélodysplasiques | 25 | 3.8 | 1.4 |
| Leucémie aiguë myéloïde (LAM) | 22 | 3.4 | 2.1 |
| LNH de la zone marginale | 19 | 2.9 | 1.3 |
| LNH folliculaire | 19 | 2.9 | 1.5 |
| Lymphome de Hodgkin | 18 | 2.8 | 2.8 |
| LNH T/NK à cellules matures | 12 | 1.8 | 0.9 |
| Leucémie myélomonocytaire chronique et autres SMM | 10 | 1.5 | 0.4 |
| LLP/ Maladie de Waldenström | 9 | 1.4 | 0.8 |
| Leucémie myéloïde chronique (LMC) | 4 | 0.6 | 0.4 |
| LNH du manteau | 2 | 0.3 | 0.1 |
| Leucémie / Lymphome lymphoblastique | 2 | 0.3 | 0.6 |
| Leucémie à tricholeucocytes | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Lymphome de Burkitt | 0 | 0.0 | 0.0 |
| <hr/> | | | |
| Autres | 35 | 5.4 | 3.5 |
| <hr/> | | | |
| TOTAL | 3304 | 506.2 | 269.3 |

¹Standardisé sur la population féminine mondiale
TI : Taux d'incidence pour 100 000